

## NOTE VI.

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DU  
GENRE PLATYPRIA

PAR

le Dr. R. GESTRO.

Je suis redevable à l'amabilité de M. Ritsema de l'occasion de décrire une nouvelle espèce de *Platypria*, genre qui a été jadis l'objet de quelques uns de mes travaux et je remercie le savant Conservateur au Musée de Leyde d'avoir été et d'être toujours si obligeant et si large dans ses communications avec moi.

*Platypria squalida*, n. sp.

*Subquadrata, subopaca, supra brunnea, subtus flavo-ferruginea; prothorace utrinque lobato, lobis subnitidis sex-spinosis, spinis 1<sup>a</sup> et 6<sup>a</sup> brevioribus, disco opaco, medio longitudinaliter parum profunde sulcato, basi transversim impresso et ruguloso; elytris opacis, pube tenui cinerea indutis, margine laterali subnitido, punctato-striatis, spinis discoidalibus brevibus conicis, inæqualibus, apice nigris, lobo antico sex-spinoso, lobo postico tri-spinoso. — Long. 6 $\frac{1}{2}$  millim.*

Même taille que *subopaca* Chap., corps brun en dessus, jaune ferrugineux en dessous. Tête à front sillonné au milieu; antennes de la couleur du corps. Corselet mat, à disque presque plan, avec un léger sillon longitudinal

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX.

au milieu, se joignant à la base avec une impression transversale, densément rugueux le long de cette impression, éparsément sur le milieu en avant. Expansions latérales du corselet légèrement brillantes, rétrécies au sommet et armées de six épines, dont les quatre intermédiaires assez longues, l'antérieure et la sixième plus courtes. Ecusson triangulaire, arrondi en arrière, chagriné. Elytres mats, recouverts d'une pubescence grisâtre très fine; le pourtour latéral plus clair et légèrement brillant; régulièrement ponctués-striés; le lobe antérieur armé de six épines égales, le postérieur de trois; épines discoïdales inégales entre elles, courtes, coniques, avec la pointe noire.

Cette espèce est très rapprochée de *subopaca* Chap. des îles Philippines, dont elle diffère principalement par la présence de six épines au lobe antérieur des élytres, au lieu de cinq <sup>1)</sup> et par le corselet unicolore.

J'en ai examiné trois exemplaires recueillis par Mr. Forsten à Gorontalo et à Tondano (Célèbes sept.). Tous les trois appartiennent au Musée de Leyde.

Gênes, Museo Civico di Storia Naturale,  
6 Janvier 1898.

---

1) Voir ma note sur les *Platypria* (Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, XXXVIII, 1897, pag. 116).